

2019 - 2020
ÜRÜN KATALOĐU

Janset
KAFKAS
TOHUM-SEED



Kafkas Tohum 1990 yılında Bursa' nın Karacabey İlçesinde kurulmuştur.

Şirketimiz sebze tohumluk üretimi, bitki ıslahı ve çeşit geliştirme, işleme, ambalajlama yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tanıtılması, dağıtım ve satışa sunulması konularında faaliyet göstermektedir.

29 yıldır deneyimli çalışanlarıyla, ıslah çalışmaları sonucu kendi çeşitleriyle, değerli üreticilerimize kaliteli hizmet sunmaktadır.

Amacımız yurt içi ve yurt dışında bir türk markası olarak adımızı duyurmak, ülkemiz tarımına ve ekonomisine katkıda bulunmaktır.





ERBAŞ

Kısa gün ve erkenci bir çeşittir. Ülkemizde en çok Marmara ve Akdeniz bölgesinde uyum sağlamıştır ve bu bölgelerde ekimi yapılmaktadır. Şekli yuvarlak olup kabuk rengi açık sarıdır. Kabuk bağlama özelliği Akkaya'ya göre daha iyidir taze tüketilir depolamaya elverişli değildir.

Ekim zamanı bölgelere ve iklim şartlarına göre farklılıklar gösterir. Marmara bölgesinde 10 Eylül - 30 Eylül arası, Akdeniz bölgesinde 15 Eylül - 15 Ekim arası ekilmesi uygun görülür.

Ekim havalı ve standart mibzerle yapılır. Ekim derinliği toprak yapısına göre 2 - 4 cm, ekim aralığı 20 - 25 cm olmalıdır. Mibzerle yapılan ekimlerde tohum çimlenme oranına göre 800 - 1000 gr / dekar tohum kullanılır. Ekilecek tarla çok düzgün ve ince hazırlanmalıdır.

Ekimden sonra toprak gevşek ise merdane veya loğ ile sıkıştırılmasında fayda vardır. Ekimden sonra ot gelmesini istemiyorsak ekimin akabinde muhakkak iğlenmelidir.

AKKAYA

Kısağün soğan çeşitidir, Ülkemizde en çok Akdeniz bölgesinde ekim yapılmakla beraber yapılmakla beraber Ege ve Marmara bölgesine de uyum sağlamıştır.

Soğanlar yuvarlak olup, albenisi mükemmeldir. 1 – 2 adet kabuğu ile depolamaya elverişli değildir; taze tüketilir. Kabuk rengi parlak saman sarısı renktir. Zaman içerisinde koyulaşma eğilimi gösterir. Etli kısmı krem beyazdır.

Ekim zamanı bölgelere ve iklim şartlarına göre farklılıklar gösterir. Marmara bölgesinde 15 Eylül - 15 Ekim arası, Akdeniz bölgesinde de 25 Eylül – 25 Ekim arası ekilmesi uygun görülür. Ekim havalı ve standart mibzerle yapılır.

Ekim derinliği toprak yapısına göre 2 – 4 cm, ekim aralığı 20 - 25 cm olmalıdır. Mibzerle yapılan ekimlerde tohum çimlenme oranına göre 800 - 1000 gr / dekar tohum harcanır. Ekilecek tarla çok düzgün ve ince hazırlanmalıdır.

Ekimden sonra toprak gevşek ise merdane veya loğ ile sıkıştırılmasında fayda vardır. Ekimden sonra ot gelmesini istemiyorsak ekimin akabinde muhakkak ilaçlanmalıdır.



JANSET

Orta Uzungün soğan çeşididir. Şekli yuvarlak olup koyu saman rengindedir. Kabuk sayısı az olmasına rağmen depolanabilir özelliğe sahiptir.

Genellikle Orta Anadolu şartlarına uyum sağlasa da nispi nemi düşük diğer bölgelerde de yetiştirilebilir. Ekim zamanı bölgelere göre farklılıklar gösterse de, kışı ılıman geçen yerlerde ocak ve şubat, sert geçen yerlerde de Şubat - Mart aralığında olması tavsiye edilir.

Ekim havalı veya standart mibzerlerle yapılır. Tarla çok iyi hazırlanmalıdır. Tarlanın keseksiz hazırlanmasına özen gösterilmelidir. Ekim derinliği toprak yapısına göre 2-3 cm olmalıdır. Tohumun çimlenme oranına göre 500-700 gr/dekar tohum ekilir. Ekimden sonra tarla gevşek kalırsa üzerine (merdane ve log) çekilmesinde fayda vardır.

İşçiliğin asgariye indirilmesi isteniyorsa ekimden sonra muhakkak ot ilacı (herbisit) kullanılmalıdır.



JANKAT

Uzungün soğan çeşididir. Ülkemizde en çok ekilen çeşittir. Yabancı bir çeşitten ıslah edilerek iyileştirilmiştir.

Soğanlar yuvarlak olup albenisi mükemmeldir. Kalın kabuk yapısıyla depolamaya son derece elverişlidir. Kabuk rengi genellikle kahve kırmızı ortası olup zamanla kabuğu koyulaşma eğilimi gösterir. Etli kısım krem beyazdır.

Türkiye'nin çok yerinde (nispi nemi düşük) yetiştirilebilir.

Ekim zamanı bölgelere ve iklim şartlarına göre farklılıklar gösterir. Ilıman bölgelerde Ocak Şubat aylarında, kışı sert geçen bölgelerde (Orta Anadolu) Şubat - Mart aylarında ekilmesi tavsiye edilir.

Ekim havalı veya standart mibzerlerle yapılır. Bazı bölgelerde saçma usulü ile yapılsa da pek tavsiye edilmez. Ekim derinliği toprak yapısına göre 2-4 cm, ekim aralığı 20-25 cm arasında olmalıdır. Mibzerlerle yapılan ekimlerde tohumun çimlenme oranına göre 500-700 gr/dekar tohum kullanılır. Ekilecek tarla çok düzgün ve ince hazırlanmalıdır.

Ekimden sonra toprak gevşek ise merdane veya log ile sıkıştırılmasında fayda vardır. Ekimden sonra işçilik masraflarının asgariye indirilmesi isteniyorsa ekimden hemen sonra muhakkak ilaçlanmalıdır.



SOÇI

Ülkemizde en çok ekilen uzungün soğan çeşididir.

Şekli yuvarlak olup, kabuk rengi bakır kırmızısıdır. 5-7 kat kabuğu ile depolamaya son derece elverişlidir.

Ekim zamanı bölgelere ve iklim şartlarına göre farklılıklar gösterir. Ilıman bölgelerde Ocak Şubat aylarında, kışı sert geçen bölgelerde (Orta Anadolu) Şubat - Mart aylarında ekilmesi tavsiye edilir.

Ekim havalı veya standart mibzerlerle yapılır. Bazı bölgelerde saçma usulü ile yapılırsa da pek tavsiye edilmez. Ekim derinliği toprak yapısına göre 2-4 cm, ekim aralığı 20-25 cm arasında olmalıdır. Mibzerlerle yapılan ekimlerde tohumun çimlenme oranına göre 500-700 gr/dekar tohum kullanılır. Ekilecek tarla çok düzgün ve ince hazırlanmalıdır.

Ekimden sonra toprak gevşek ise merdane veya log ile sıkıştırılmasında fayda vardır. Ekimden sonra işçilik masraflarının asgariye indirilmesi isteniyorsa ekimden hemen sonra muhakkak ilaçlanmalıdır.



AKBEY

Orta gei soėan eřitidir. Őekli ysyuvarlak, son derece albenisi olan, kabuk ve etli kısmı beyaz - kerm rengi arasında olan bir eřitidir.

ok iyi kurutulmadan depolama yapılmamalıdır. Depolama zelliėi orta derecededir.

Orta Anadolu ve Marmara blgelerinde az da olsa ekimi yapılmaktadır. Verimi iyidir.

Ekim zamanı blgelere ve iklim Őartlarına gre farklılıklar gsterir. Marmara blgesinde Őubat ayı iersinde, Orta Anadolu blgesinde de Mart bařından Nisan bařına kadar ekilmesi tavsiye edilir.

Ekim havalı veya standart mibzerle yapılır. Bazı blgelerde sama usul ile yapılsada pek tavsiye edilmez. Ekim derinliėi toprak yapısına gre 2 -4 cm, ekim aralıėı 20-25 cm arasında olmalıdır. mibzerle yapılan ekimlerde tohumun imlenme oranına gre 500- 700 gr./ dekar tohum kullanılır. Ekilecek tarla ok dzgn ve ince hazırlanmalıdır.

Ekimden sonra toprak gevŐek ise merdane veya loė ile sıkılařtırılmasında fayda vardır. Ekimden sonra iŐilik masraflarının asgariye indirilmesi isteniyorsa ekimden hemen sonra muhakkak ilalanmalıdır.



BOLTON

Orta uzunğün soğan çeşididir. Şekli yuvarlak olup, rengi koyu saman rengindedir. Kabuk sayısı orta seviyede olmasına rağmen depolanabilir özelliğe sahiptir.

Genellikle Orta Anadolu şartlarına uyum sağlasa da nispi nemi düşük diğer bölgelerde de yetiştirilebilir. Ekim zamanı bölgelere göre farklılıklar gösterse de, kışı ılıman geçen yerlerde ocak ve şubat, sert geçen yerlerde de Şubat Mart aralığında olması tavsiye edilir.

Ekim havalı veya standart mibzerlerle yapılır. Tarla çok iyi hazırlanmalıdır. Tarlanın keseksiz hazırlanmasına özen gösterilmelidir. Ekim derinliği toprak yapısına göre 2-3 cm olmalıdır. Tohumun çimlenme oranına göre 500-700 gr/dekar tohum ekilir. Ekimden sonra tarla gevşek kalırsa üzerine (merdane ve log) çekilmesinde fayda vardır.

İşçiliğin asgariye indirilmesi isteniyorsa ekimden sonra muhakkak ot ilacı (herbisit) kullanılmalıdır.



KIZILKAYA

Uzungen soğan çeşididir. Şekli yuvarlak, kabuk rengi kızıl kahveye çalan son derece albenili bir çeşittir. Kabuk rengi ve şeklinden dolayı son yıllarda popülaritesi artıp, ekimi hızla çoğalan bir çeşittir. Etli kısmı krem rengindedir.

Depolamaya uygun bir çeşittir. Genellikle Orta Anadolu (Çorum ve Amasya) bölgesine uyum sağlamıştır. Ekim zamanı bölgelere göre farklılıklar gösterse de, kışı ılıman geçen yerlerde ocak ve şubat, sert geçen yerlerde de Şubat Mart aralığında olması tavsiye edilir.

Ekim havalı veya standart mibzerlerle yapılır. Tarla çok iyi hazırlanmalıdır. Tarlanın keseksiz hazırlanmasına özen gösterilmelidir. Ekim derinliği toprak yapısına göre 2-3 cm olmalıdır. Tohumun çimlenme oranına göre 500-700 gr/dekar tohum ekilir. Ekimden sonra tarla gevşek kalırsa üzerine (merdane ve log) çekilmesinde fayda vardır.

İşçiliğin asgariye indirilmesi isteniyorsa ekimden sonra muhakkak ot ilacı (herbisit) kullanılmalıdır.

2019 - 2020
ÜRÜN KATALOĐU



☎ 0224 676 86 24
☎ 0532 415 16 28
☎ 0549 775 89 78

✉ info@kafkastohum.com
🌐 www.kafkastohum.com

📍 RungupaŐa Mah. 75 Sk. Kızılay İŐ Merkezi Kat 1 - Karacabey / BURSA